

アブストラル[®]舌下錠を使う時の注意

必ず使用前に読んでください

使用するときの注意

- このくすりは医療用麻薬です。患者さん本人以外は絶対に使用しないでください。また、他の人に渡さないでください。
- 次のような場合は医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 他に服用しているくすりがある場合(薬局で買ったくすりも含みます)。
 - (2) 妊娠している、または妊娠の可能性がある場合(くすりが胎児に影響することがあります)。
 - (3) 授乳中の場合(くすりが母乳に移行し、乳児に影響を与えることがあります)。
- 使用中は、くすりにより眠気、めまいが起こることがありますので、車の運転など危険な機械の操作は控えてください。
- このくすりは、使用する直前にシートから取り出して服用してください。
- このくすりを服用する場合は、舌の下の奥の方に錠剤を入れてください。また、噛んだり飲み込んだりしないように注意してください(裏面参照)。

副作用に関する注意

- 以下のような症状があらわれた場合は、すぐに使用を中止し、医師に連絡して指示に従ってください。
 - (1) 呼吸が苦しくなる、不規則になる、浅くなる、遅くなるなどの、呼吸が異常になる症状。
 - (2) 意識がぼうっとする、意識がなくなるなどの症状。
 - (3) 顔色が悪くなる、冷や汗が出る、脈が弱くなる、速くなる、失神するなどの症状。
 - (4) 筋肉がひきつる(ピクピクするなど)、けいれんをおこすなどの症状。

アブストラル[®]舌下錠を保管するときの注意

- 必ず、子どもの手の届かない所に保管してください。
- くすりは使う直前にシートから取り出してください。
- 湿気を避け室温で、シートで保管してください。
- このくすりは、衝撃によって欠けたり割れたりすることがあるので、取り扱いに注意してください。

※使わずに余ったくすりは、病院または薬局へ返却してください。

本剤の使用を中止した場合、用量変更により使用しなくなった含量のくすりがある場合、または他の速放性フェンタニル製剤から本剤に変更する場合にも、残っている薬は病院または薬局へ返却してください。

その他、このくすりに関するお問い合わせは
担当の医師または薬剤師にお尋ねください。



アブストラル[®]舌下錠の使い方

注意




- このくすりの使い方については、必ず担当の医師または薬剤師の指示に従ってご使用ください。
- 患者さん本人以外は絶対に使用しないでください。また、他の人に渡さないでください。
- 担当の医師の指示なしに使用量を変更することは、絶対にしてはいけません。個人の判断で増量したり、不適切に使用した場合には、死に至る可能性があるため、医師や薬剤師の指示通りに使用してください。
- この錠剤は強い痛みをやわらげるくすりが含まれています。舌の下に入れて自然に溶かし、口腔の粘膜から吸収することにより効果が得られます。

1. くすりを使う直前にシートから取り出してください。


ギザギザの
ところから
開ける



手前に最後
までまっす
ぐに引く



2. 舌の下の奥の方に錠剤を入れてください。



口の中で錠剤を動かさないようにして溶かしてください。この錠剤は舌の下ですぐに溶けます。

服用時の注意点

①




錠剤を飲み込まないでください。

②




錠剤を噛み砕かないでください。

③



錠剤を舐めないでください。

④



水分を飲みながらの服薬はしないでください。

3. 錠剤が完全に溶けるまでは飲食を控えてください。



※口の中が乾燥している場合は、少しの水を口に含んで湿らせてから使うことができます。その場合は、錠剤を口に入れる前に、口に含んだ水を飲み込むか吐き出すようにしてください。