

# フェンタニル3日用テープ「HMT」を ご使用の患者さんへ

この患者さん用の文書は、フェンタニル3日用テープ「HMT」各含量とも包装1箱(フェンタニル3日用テープ「HMT」5枚入り)につき1枚を封入していますが、必要に応じて追加でお使いください。

劇薬 麻薬 処方箋医薬品\*  
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤

\* 注意-医師等の処方箋により使用すること

薬価基準収載

## フェンタニル3日用テープ

2.1mg「HMT」  
4.2mg「HMT」  
8.4mg「HMT」  
12.6mg「HMT」  
16.8mg「HMT」


# フェンタニル3日用テープ「HMT」の使い方

※フェンタニル3日用テープ「HMT」は本文中では「テープ」と表記しています。

## 注意

- このテープは『医療用麻薬』です。必ず担当医師または薬剤師の指示にしたがってご使用ください。
- 患者さん本人以外は絶対に使用しないでください。また、他の人に渡さないでください。
- 3日に1回貼り替えてください。担当医師の指示なしに貼る枚数を絶対に変えないでください。
- このテープをハサミなどで切って使用しないでください。また、傷ついたテープは使用しないでください。
- 皮膚に傷や異常のある場所や放射線を照射する場所などには貼らないでください。
- 何か異常を感じた際は、すぐに担当医師または薬剤師に連絡してください。


## はじめに




- テープを貼る場所を決めます。胸部、腹部、上腕部、大腿部のいずれかに貼ってください。貼る場所は毎回変えてください。
- あらかじめ貼る場所を乾いたタオルなどで拭いて、水分や汗をよく取り除いてください。このとき、石けん、アルコール、ローションなどは使用しないでください\*。
- なるべく体毛のない場所に貼ってください。体毛がある場合は、ハサミで短くカットしてください。カミソリ、除毛剤などは使わないでください\*。

\*皮膚からのくすりの有効成分の吸収に影響することがあります。

- 1** “①ここから開封してください”と書いてある所から手で破ってください。




- 2** “②つぎにこちらを開封してください”と書いてある所を破ってテープを取り出してください。



- 3** テープ表面の“○月○日○時”と書いてある所に、貼る日にちと時間を直接記入してください。

ペン・ボールペンで直接書けます。水性ペンは乾きが遅いのでご注意ください。




- 4** テープには透明なフィルムがついています。“ここからはがす”と書いてあるフィルム面を上にしてかるく半分まで、中央の波型部分から片方のフィルムをはがしてください。



粘着面に触れないようご注意ください。

- 5** フィルムを取り除いたテープの半部分を皮膚に貼ってください。次に残りの半分のフィルムをはがして貼ってください。



- 6** テープを貼った後は約30秒間、手のひらでテープをしっかり押さえてください。



- 7** テープを貼った後は水道水で手をよく洗ってください。



# フェンタニル3日用テープ「HMT」を使うときの注意

※フェンタニル3日用テープ「HMT」は本文中では「テープ」と表記しています。

**使用前に必ず読んでください。**

## 使用するときの注意

- **このテープは3日用です。3日(約72時間)に1回貼り替えてください。**
- **患者さん本人以外は絶対に使用しないでください。**
- **次のような場合は医師または薬剤師に相談してください。**
  - (1) **40℃以上の発熱がある場合**  
体内に吸収されるくすりの量が増え過ぎることがあります。
  - (2) **妊娠または妊娠している可能性がある場合**  
くすりが胎児に影響することがあります。
  - (3) **授乳中の場合**  
くすりが母乳に移行し、乳児に影響を与えることがあります。
  - (4) **他に服用しているくすりがある場合(薬局・ドラッグストアで購入したくすりも含まれます)**
- **テープを貼った場所が熱源に接しないようにしてください。**  
**熱源: 電気パッド、電気毛布、加温ウォーターベッド、赤外線灯、カイロ、こたつ、集中的な日光浴、サウナ、湯たんぽなど**  
体内に吸収されるくすりの量が増え過ぎることがあります。
- **入浴する場合は長時間、または熱い温度を避けてください。**  
体内に吸収されるくすりの量が増え過ぎることがあります。
- **テープの使用中は車の運転など危険をともなう機械の操作は避けてください。**  
くすりにより眠気、めまいが起こることがあります。

## 副作用に関する注意

- **次のような症状があらわれた場合は、すぐにテープをはがし、医師に連絡して指示にしたがってください。**
  - (1) **呼吸が苦しくなる、不規則になる、浅くなる、遅くなるなど**
  - (2) **意識が薄れる、なくなるなど**
  - (3) **顔色が悪くなる、冷汗がでる、脈が弱くなる、速くなるなど**
  - (4) **筋肉がひきつる、けいれんを起こすなど**

## テープを捨てるときの注意

- **使用済みのテープは粘着面を内側にして貼り合わせた後、廃棄してください。**  
子どもやペットが触ることができない場所に廃棄してください。  
使用済みのテープでもくすりが残っているため、人やペットに重大な影響をおよぼすことがあります。
- **廃棄後は水道水で手をよく洗ってください。**
- **使用しなかったテープは病院または薬局に返却してください。**

## テープの保管方法

- **未使用のテープは包装袋を開けないでください。**
- **テープは子どもやペットが触ることができない、高温にならない所に保管してください。**

その他、このくすりに関するお問い合わせは担当医師または薬剤師におたずねください。

