

ご使用になる前に必ずお読みください



安全にお使いいただくため、処方された患者さん以外はお使いにならないでください。

この薬を他の人に譲ってはいけません。



貼付部を紫外線にあてると**光線過敏症**をおこすことがあります。

- (1) 戸外に出るときは天候にかかわらず、濃い色の衣服、サポーター等を着用し貼付部を紫外線にあてないでください。
- (2) はがした後、少なくとも4週間は同様に注意してください。

詳しくは中面をご覧ください

このくすりは妊娠後期の女性には使用できません。

● 妊娠後期の女性は使用しないでください。



使用上の注意

モーラステープ® 20mg

モーラステープ® L 40mg

モーラステープ® XR 120mg

モーラステープ® XR 240mg

モーラステープ® 30mg

モーラステープ® 60mg

を使用されている方へ



管理上のご注意

このくすりを他人に譲ってはいけません。
お子さん、お孫さん、ご友人などにも
譲らないでください。

- 使用上の注意を知らず、
紫外線にあたり、かぶれる
おそれがあります。



使用中のご注意

外での活動はひかえ、貼ったところを
紫外線にあてないでください。
かぶれるおそれがあります。

- 貼ったところを紫外線に
あてないようにしましょう。



- 長袖・長ズボンやサポーター等で、
貼ったところを紫外線から
さえぎるようにしましょう。



使用後のご注意

はがした後も、少なくとも4週間は
紫外線にあてないよう注意してください。

- はがした後もくすりは皮膚に残っています。
使用中と同じように、貼った
ところを紫外線にあてない
よう注意しましょう。



ご 注 意 !!

紫外線はくもりの日でも、ふりそそいでいます。
外に出るときは、くもりの日も長袖・長ズボン
やサポーター等で、貼ったところを紫外線
からさえぎるよう注意してください。



その他の注意事項

- 貼ったところにかぶれが起こったら、すぐに使用を中止
し、医師または薬剤師にご相談ください。
- かぶれた部分を紫外線にあてると悪化し、まれに全身
に症状が広がる可能性があります。
- かぶれのあとにしみ(色素沈着)が残ることがあります。