


モーラスパップXRをご使用の患者さんへ

1. 貼ったところを日光にあてることにより、過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、はれなどのかぶれ)が起こることがあります。



特に20歳未満の人は、邵活動や体育行事などで日光にあたる機会が多く、かぶれが発現する可能性が高いと考えられますのでご注意ください。

2. その他の注意事項

妊娠後期の女性は使用しないでください。

外用剤(バップ、クリーム、軟膏、液など)、化粧品、サンスクリーン、香水等でかぶれたことのある方は、医師または薬剤師にご相談ください。

このくすりに入っている成分によりかぶれたことがある方が使用すると、かぶれることがあります。

貼ったところにかぶれが起つたら、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

かぶれているのに使い続けると、かぶれが悪化します。また、かぶれを日光にあてると悪化し、まれに全身にかぶれが拡がることがあります。

かぶれのあとに、しみ(色素沈着)ができることがあります。

このくすりを貼ってかぶれなどの過敏症状が起こった方は、以後、ケトプロフェン製剤(坐剤など複数の異なる製剤、一般用を含む)の使用を控えてください。


このくすりを人に譲ってはいけません。(お子さま、お孫さま、友人など)

譲られて正しい使い方を知らないで使用し、かぶれが発現した例があります。


モーラスパップXRの上手な貼り方




3つ折にして左右に引っ張ると、フィルムの真ん中がはがれて浮き上がります。



片方ずつフィルムを折り目まではがします。



薬面を患部に貼り、片方のフィルムをゆっくりはがしながら貼ります。



もう片方のフィルムもゆっくりはがしながら貼ります。

作成:久光製薬株式会社
作成年月:2016年12月

直射日光や高温の場所をさけて涼しい所に保管してください。
MSXWS001R00

薬袋の裏の「記載」をよくお読みの上、正しくお使いください。発疹・発赤、かゆみ、はれなどの異常があらわれたら、すぐに使用を中止し患部を遮光して主治医又は皮膚科専門医にご相談ください。