


↓ 包装袋を下部のサイズ別の差し込み口に入れ、
包装袋上部を差し込みで挟んでご使用ください。



TBT1S005R00

2019.12-KK-0
作販:久光製薬株式会社

- お薬は使用するまで袋を開けず、直前に開封し、速やかに貼ってください。
- 高温を避け、子供の手の届かないところに保管してください。
- 捨てるにも子供が誤って貼らないよう(粘着面を内側に2つに折るなど)注意してください。
- このお薬の包装袋はプラスチック製です。捨てるときは各自自治体の分別ルールに従ってください。

保管上の注意・捨てるときの注意

- お薬を透明なフィルムからはがすときに左右に強くひくると、破れるおそれがあります。
- 傷口や湿疹等のあるところには貼らないでください。
- 汗をかきやすいところや、クレーム、軟膏等をぬった部分には貼らないでください。
- 貼り付ける面に指がふれると粘着力が低下して、うまく貼れないことがあります。
- このお薬は1度をはがしたら、再び貼り直すことができません。
- お薬をはがしてしまつ可能性があるお子供には、手の届かないところに貼ってください。
- お薬が少しはがれた場合は、刺激の少ない絆創膏等で固定してください。
- 同じところに続けて貼ると、かゆくなったり、赤くなったり、かぶれたりすることがあるので、新しいお薬に貼りかえるときは、同じところを避けて貼ってください。
- このお薬を使って、何か異常が認められた場合には、医師または薬剤師に相談してください。
- 必ず医師または薬剤師の指示に従って使用してください。(貼る回数・貼る枚数など) また、このお薬を家族や他の人にゆずってはいけません。

その他の貼るときの注意

日本薬局方 ツロブテロール経皮吸収型テープ
ツロブテロールテープ「久光」/0.5mg「久光」/1mg「久光」/2mg「久光」

Hisamitsu®

ツロブテロールテープ「久光」を
使用されている方へ


日本薬局方 ツロブテロール経皮吸収型テープ

ツロブテロールテープ®
0.5mg「久光」/1mg「久光」/2mg「久光」



貼るときの注意

- **1日1回** 貼りかえます。
- 胸、背中、上腕のいずれか貼る部位を
1カ所 選んで貼ってください。



胸

背中

上腕

貼り忘れがないように チェックしましょう!

1日1回1カ所に貼ります

貼り終わりましたら下の枠内にチェックを入れてください。

2週間分	1日目 <input type="checkbox"/>	2日目 <input type="checkbox"/>
3日目 <input type="checkbox"/>	4日目 <input type="checkbox"/>	5日目 <input type="checkbox"/>
6日目 <input type="checkbox"/>	7日目 <input type="checkbox"/>	8日目 <input type="checkbox"/>
9日目 <input type="checkbox"/>	10日目 <input type="checkbox"/>	11日目 <input type="checkbox"/>
12日目 <input type="checkbox"/>	13日目 <input type="checkbox"/>	14日目 <input type="checkbox"/>

