

平成 27 年 1 月

医療従事者様 各位

久光製薬株式会社

経皮鎮痛消炎剤

セクター[®]クリーム 3%
ケトプロフェン3%

セクター[®]ゲル 3%
ケトプロフェン3%

セクター[®]ローション 3%
ケトプロフェン3%

【使用上の注意】改訂に伴う容器の記載内容変更

及び中箱・外箱段ボール記載内容の変更のご案内

謹啓

時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は当社商品に格別のご高配を頂き、厚く御礼申し上げます。

さて、このたびセクター[®]クリーム 3%、セクター[®]ゲル 3%、セクター[®]ローション 3%において、【使用上の注意】を改訂いたしました。

それに伴い、容器の注意事項を追記し、個装箱・梱包箱の記載内容も一部変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

変更之际しまして、従来品と変更品が流通しご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

— 記 —

《容器の記載内容変更》

【使用上の注意】改訂に伴い、容器の【注意】に「妊娠後期の女性は使用しないでください。」と追記しました。

《変更前》

《変更後》



Hisamitsu[®]
経皮鎮痛消炎剤
セクター[®]ローション 3%
100mL
成分：1mL中日局ケトプロフェン30mg含有
貯法：室温保存（遮光した気密容器）

【注意】

- 1.使用中及び使用後少なくとも4週間間は塗布部を紫外線に当てないでください。
- 2.眼及び粘膜には使わないでください。
- 3.小児の手の届かない所に保管してください。
- 4.直射日光を避け、密栓し涼しい所に保管してください。
- 5.火気に近づけないでください。

BF505T

Hisamitsu[®]
経皮鎮痛消炎剤
セクター[®]ローション 3%
100mL
成分：1mL中日局ケトプロフェン30mg含有
貯法：室温保存（遮光した気密容器）

【注意】

- 1.使用中及び使用後少なくとも4週間間は塗布部を紫外線に当てないでください。
- 2.妊娠後期の女性は使用しないでください。
- 3.眼及び粘膜には使わないでください。
- 4.小児の手の届かない所に保管してください。
- 5.直射日光を避け、密栓し涼しい所に保管してください。
- 6.火気に近づけないでください。

CF505T

※上記はセクター[®]ローション 3%の容器ですが、セクター[®]クリーム 3%、セクター[®]ゲル 3%の容器も同様に追記します。

《変更品の識別方法》

この度の変更に伴い、個装箱・梱包箱に下記の通り、表示いたします。

セクター®クリーム 3%、セクターゲル®3% : チューブ表示変更品

セクター®ローション 3% : ボトル表示変更品

【変更品製造番号、出荷予定時期、使用期限】

商品名	包装	ロット番号	出荷予定時期	使用期限
セクター®クリーム 3%	25g/1本×10本	40110	2014年11月	2017年10月
	25g/1本×50本	40111	2015年1月	2017年11月
	50g/1本×50本	40211	2015年2月	2017年11月
セクターゲル®3%	25g/1本×10本	40110	2014年12月	2017年10月
	25g/1本×50本	未定	未定	未定
	50g/1本×50本	未定	未定	未定
セクター®ローション 3%	50mL/1本×10本	40109	2014年10月	2017年9月
	50mL/1本×40本	40110	2015年1月	2017年10月
	100mL/1本×10本	40512	2015年2月	2017年12月

※未定となっている包装のロット番号等につきましては決定次第ご連絡申し上げます。

※統一商品コード等の変更はございません。

※出荷予定時期は在庫状況により前後することがございます。大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

以上