

経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤

処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

ジクロフェナクナトリウム経皮吸収型製剤

薬価基準収載

ジクトルテープ® 75mg

ZICTHORU® Tapes 75mg

商品仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当社商品に格別のご高配をいただき、厚く御礼申し上げます。

経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤ジクトル®テープに関しまして、包装袋に「商品名の点字追加」、香料追加ならびに包装単位変更に伴い商品仕様の変更をいたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後とも、なお一層のご愛顧をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。


謹白

久光製薬株式会社

変更内容

商品名の点字表記を追加し、包装袋のデザインを変更しました。

包装袋の表面に商品名を点字で「クスリ ジクトルテープ」と表記しました。



※掲載の図は、実際の製剤とサイズ・比率が異なります。

文献請求先及び問い合わせ先

久光製薬株式会社 お客様相談室

〒135-6008 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 TEL.0120-381332 FAX.(03)5293-1723 受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

貼付時の「におい」を軽減するために、香料を添加しました。

「組成・性状」の中で、下線部の添加剤が追加になりました。

現行品

【組成・性状】

添加剤
脂環族飽和炭化水素樹脂、ジメチルスルホキシド、水素添加ロジングリセリンエステル、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、精製オレイン酸、ポリイソブチレン、流動パラフィン(その他3成分)



変更品

【組成・性状】

添加剤
香料(フェニルエチルアルコール)
脂環族飽和炭化水素樹脂、ジメチルスルホキシド、水素添加ロジングリセリンエステル、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、精製オレイン酸、ポリイソブチレン、流動パラフィン(その他3成分)


包装単位を70枚包装に変更しました。

包装単位変更に伴い、デザインならびにサイズを変更しました。


変更品



「開封口」の表記を変更しました。



「開封済」の表記を追加しました。



販売包装単位

70枚(1枚/1袋×70袋)

※掲載の図は、実際のサイズ・比率が異なります。

幅×奥行×高さ(mm)

包装	現行品	包装	変更品
140枚	228.5 × 144 × 119	70枚	111.6 × 105.1 × 149.1

変更品



元梱包装単位

70枚(1枚/1袋×70袋) × 16箱

※掲載の図は、実際のサイズ・比率が異なります。

幅×奥行×高さ(mm)

包装	現行品	包装	変更品
140枚×8箱	479 × 308 × 267	70枚×16箱	469 × 319 × 243

使い方説明書のデザインを変更しました。

変更品

【表面】

hisamitsu.

**ジクトルテープ 75mg を
使用されている方へ**

ご使用の際には、必ずお読みください。

ジクトルテープ75mgについて




このお薬は有効成分を皮膚から吸収させるようにした貼付剤で、痛みを抑える働きがあります。

このお薬は1日1回貼るお薬です。1枚ずつ包装されています。

貼る場所

胸、お腹、上腕、背中、腰、太ももに貼ってください。

◎皮膚への刺激を減らすために、貼り替えるときは、前回は異なる場所に貼ってください。



☑ 担当の医師に指示された1日あたりの使用枚数を守ってください。

☑ 指示なしに使用枚数を変更することは絶対にしてはいけません。

☑ 本剤は、貼った場所だけでなく全身に作用するため、他の消炎鎮痛剤との併用は避けてください。
痛み止め、解熱剤、風邪薬を使用する場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
*非ステロイド性消炎鎮痛剤を含む薬

☑ 処方された患者さん以外はお使いにならないでください。

☑ 妊婦又は妊娠している可能性のある患者さんはお使いにならないでください。

2JA20A
ZITS001R01d

【裏面】

使用するときの注意

- ◎赤みやかゆみ、傷がない場所に貼ってください。
- ◎お薬がはがれ落ちた場合は、すぐに新しいお薬を貼り、次の貼り替えは、いつもの時間に貼り替えてください。

保管上の注意

- ◎包装袋は貼る直前まで開封しないでください。
- ◎このお薬は子どもの手や目の届かない所に保管してください。
- ◎高温にならない場所で保管してください。



副作用に関する注意

- ◎副作用として貼った箇所の皮膚症状(赤くなる、かゆみなど)が報告されています。
- ◎このお薬を使用して体調不良などを感じる事があれば、医師または薬剤師にご相談ください。

使用したあとの注意

- ◎ゆっくりと優しく皮膚からはがしてください。
- ◎使用済みのお薬には成分が残っているため、粘着面を内側にして折りたたんでください。また子どもの手や目の届かないところに捨ててください。
- ◎このお薬の包装はプラスチック製です。捨てる時は各自自治体の分別ルールに従ってください。
- ◎お薬をはがしたあとは、手を目に触れず、手を水でよく洗ってください。



ジクトルテープ75mgの貼り方

- 貼る場所をよく拭いて清潔にしてください。また水分や汗は十分に取除いてください。
- お薬を取り出してください。
- フィルムを折り返して片手で持ち、まん中のフィルムをはがします。
- そのまま粘着面を貼ります。
- 片方ずつフィルムを引っぱりながら貼ります。
- お薬を貼ったあとは、手を水でよく洗ってください。

「上手な貼り方」を掲載しています



包装袋裏面の「二次元コード」を携帯電話またはスマートフォン、タブレットで読み取ると、貼り方が閲覧いただけます。読み取れない場合は下記のアドレスを入力してください。
<http://www.harikata.jp/z75.html>

使用方法、副作用など詳しい質問がある場合は、医師または薬剤師にお尋ねください。

製造販売元 **久光製薬株式会社**
〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

2022年1月作成

※掲載の図は、実際のサイズ・比率が異なります。

使い方説明書の入数を1枚に変更しました。

■使い方説明書の入数

現行品(140枚)	変更品(70枚)
10枚	1枚

使い方説明書を追加でご希望される場合は、医療関係者向け情報サイトである **hisamitsu サポートウェブ** 内の資料オンラインオーダーから、データのダウンロードや資料をご注文頂けます。



各種コード

製品名	包装	現行品	統一商品コード	JANコード	GS1コード	
					調剤包装単位	販売包装単位
ジクトル®テープ 75mg	140枚	現行品	188488003	4987188488003	(01) 04987188234013	(01) 14987188488000
	70枚	変更品	188488010	4987188488010	(01) 04987188234013	(01) 14987188488017

包装単位変更品の出荷予定時期および既存品の在庫消尽時期

製品名	初回製造番号	使用期限	当社からの出荷予定時期
ジクトル®テープ 75mg	Y601U	2024年5月	2022年6月下旬

※変更品の出荷時期は、在庫状況により前後する場合があります。変更の際しましては、変更前と変更後の商品が流通いたします。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

〈当社在庫消尽時期〉

ジクトル®テープ75mg(140枚包装)：2022年6月下旬(予定)

■患者さん向け説明資料

患者さん向け説明資料は、商品に封入しておりません。

Hisamitsu サポートウェブの「製品患者指導箋」でご確認、ダウンロードしていただけます。お役立てください。

■医療関係者向け情報サイト

Hisamitsu サポートウェブ

医療現場でご活用いただけるお役立ち情報やサービスをお届けしています！ぜひ、ご登録ください。

久光サポートウェブ



<https://www.hisamitsu-pharm.jp>



■患者さん向け説明資料(見本)

Hisamitsu®

ジクトルテープ® 75mg を使用されている方へ

包装袋のデザインを変更いたしました。お薬の大きさ・形「有効成分」の有効成分の含有量「効能又は効果」「用法及び用量」など、お薬に変更はございません。

現行品

【表面】

【裏面】

変更品

【表面】

包装袋の表面に商品名を点字で「クシリ ジクトルテープ」と表記しました。

【裏面】

※貼付時の「におい」を軽減するために、香料を添加しました。

※実物大ではございません。

作成：久光製薬株式会社
作成年月：2022年4月作成

ZITS006R00d