

## 使用上の注意 改訂のお知らせ

2011年7月

小児用解熱剤

劇薬

# プランサス® シロップ 1.5%

**Pransus Syrup 1.5%**  
(プラノプロフェンシロップ)

製造販売元

 **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

このたび、「プランサスシロップ1.5%」の【使用上の注意】を下記のとおり改訂致しましたのでご案内申し上げます。今後のご使用につきましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

### 【改訂内容】

〔 \_\_\_\_; 下線部改訂〕

改訂後			改訂前		
<b>【使用上の注意】</b> 3.相互作用 併用注意(併用に注意すること)			<b>【使用上の注意】</b> 3.相互作用 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
抗凝固剤 (ワルファリン、 ダビガトランエ テキシラート等)	これらの薬剤との併用により、出血の危険性が增大する可能性がある。このような場合には、患者の状態を十分に観察するなど注意すること。	本剤は血小板凝集抑制作用を有するため、これら薬剤と併用すると出血を助長するおそれがある。	クマリン系抗凝血剤 (ワルファリン等)	抗凝血作用を増強することがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	本剤のヒトでの蛋白結合率が高いので、血中に活性型の併用薬が増加し、併用薬の作用が増強されるためと考えられている。
抗血小板剤 (クロピドグレル等)			スルホニル尿素系血糖降下剤 (トルブタミド等)	血糖降下作用を増強することがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	
スルホニル尿素系血糖降下剤 (トルブタミド等)	血糖降下作用を増強することがあるので、減量するなど慎重に投与すること。	本剤のヒトでの蛋白結合率が高いので、血中に活性型の併用薬が増加し、併用薬の作用が増強されるためと考えられている。	<略>		
<略>					

### 【改訂理由】

直接トロンビン阻害剤である“ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩”製剤の添付文書に、非ステロイド性消炎鎮痛剤が併用注意として記載されたため、本剤においても併用注意の項に“ダビガトランエテキシラート”を追記して注意喚起いたします。

また、抗血小板剤(クロピドグレル等)についても、同様に併用注意とすることといたしました。

【お問い合わせ先】 **久光製薬株式会社 学術部 お客様相談室**

〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

TEL. (03)5293-1707 フリーダイヤル 0120-381332

FAX. (03)5293-1723