

使用上の注意 改訂のお知らせ

2013年1月

小児用解熱剤

劇薬 プランサス® シロップ 1.5%

Pransus Syrup 1.5%
(プラノプロフェンシロップ)

製造販売元

 **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

この度、弊社の小児用解熱剤 プランサスシロップ1.5%の【使用上の注意】を改訂致しましたのでご案内申し上げます。今後のご使用につきましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。なお、改訂後の添付文書を封入した製品がお手元に届くまでに若干日時を要する点を、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

【改訂内容】

《－使用上の注意－(改訂部分)》

(____:下線部改訂)

改訂前			改訂後		
【使用上の注意】 3.相互作用 併用注意(併用に注意すること)			【使用上の注意】 3.相互作用 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
<略>			<略>		
ニューキノロン系抗菌剤	痙攣を起こすおそれがある。	ニューキノロン系抗菌剤の中樞神経におけるGABA受容体への結合阻害が併用により増強されることが、痙攣発現機序の1つと考えられている。	ニューキノロン系抗菌剤	痙攣を起こすおそれがある。	ニューキノロン系抗菌剤の中樞神経におけるGABA受容体への結合阻害が併用により増強されることが、痙攣発現機序の1つと考えられている。
			イグラチモド	胃腸障害の発現率が増加するおそれがあるので、特に消化性潰瘍があらわれた場合には本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと(「4.副作用」の項参照)。	両剤ともにプロスタグランジン生合成阻害作用を有する。

【改訂理由】

先発医薬品の使用上の注意の改訂にあわせて、「併用注意」の項に「イグラチモド」を追記致しました。

【お問い合わせ先】 **久光製薬株式会社** 学術部 お客様相談室

フリーダイヤル 0120-381332

FAX. (03)5293-1723