

平成 26 年 2 月吉日

医療関係者様 各位

久光製薬株式会社

## 経皮吸収型エストラジオール製剤『エストラーナ<sup>®</sup>テープ 0.72 mg』

### 『効能・効果』、『用法・用量』追加のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社商品に格別のご高配を頂き、厚く御礼申し上げます。

このたび、弊社製造販売の経皮吸収型エストラジオール製剤『エストラーナ<sup>®</sup>テープ 0.72mg』は、平成 26 年 2 月に、新たな効能・効果として《性腺機能低下症、性腺摘出又は原発性卵巣不全による低エストロゲン症》の承認を取得致しましたのでここにご案内申し上げます。なお、本効能・効果追加に伴う、用法・用量等につきましては添付文書<sup>\*</sup>をご参照ください。

本剤は、平成 12 年 2 月に「更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う血管運動神経症状(Hot flush 及び発汗)、及び泌尿生殖器の萎縮症状」の治療のために発売致しました。また、平成 14 年 4 月には「閉経後骨粗鬆症」の効能・効果の追加承認を取得しております。

今後、本剤がより多くの患者さんの QOL 向上に貢献することを期待するとともに、多くの先生方の日常診療の一助になるものと考えております。

何卒、今後とも、ご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

謹白

### 「エストラーナ<sup>®</sup>テープ 0.72mg」 製品概要

	販売名	エストラーナ <sup>®</sup> テープ 0.72mg
	一般名	エストラジオール
	包装	70 枚(1 枚／1 袋×70 袋)、140 枚(1 枚／1 袋×140 袋)
	製造販売元	久光製薬株式会社

\*添付文書情報は下記弊社ウェブサイトよりご覧頂けます。

久光製薬株式会社：医療用医薬品情報 <http://www.hisamitsu.co.jp/medical/iyaku.html>

◆効能・効果、用法・用量において、下線部分を追加・変更しました。

《効能・効果》	《用法・用量》
●更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う下記症状 血管運動神経症状(Hot flush 及び発汗)、泌尿生殖器の萎縮症状	通常、成人に対しエストラジオールとして 0.72mg を下腹部、臀部のいずれかに貼付し、2 日毎に貼り替える。
●閉経後骨粗鬆症	
●性腺機能低下症、性腺摘出又は原発性卵巣不全による低エストロゲン症	通常、成人に対しエストラジオールとして 0.72mg から開始する。下腹部、臀部のいずれかに貼付し、2 日毎に貼り替え、症状に応じ増減する。 小児では、エストラジオールとして 0.09 mg から開始する。下腹部、臀部のいずれかに貼付し、2 日毎に貼り替える。その後、エストラジオールとして 0.18mg、エストラジオールとして 0.36mg、エストラジオールとして 0.72mg へ段階的に增量する。

◆なお、エストラーナテープ 0.09 mg、0.18 mg 及び 0.36 mg 製剤につきましては、現在開発中です。  
エストラーナテープ 0.72mg を低用量(0.09 mg、0.18 mg、0.36 mg)でご使用の患者さんには、  
「薬の切り取り方と保管について」の指導箋をご用意しておりますので、弊社 MR にお申し付け下さい。

#### 【お問い合わせ先】

久光製薬株式会社 学術部 お客様相談室  
〒100-6330 東京都千代田区丸の内 2-4-1  
フリーダイヤル：0120-381332  
FAX：(03)5293-1723